

# 令和6年度PM2.5成分分析調査結果について（報告）

倉敷市環境監視センター

## 1 調査目的

本調査は、大気環境中における微小粒子状物質（以下「PM2.5」という。）を捕集し、質量濃度及び成分分析を行い、環境中のPM2.5の実態を把握することを目的とする。

## 2 調査地点

松江局（松江3丁目11-26）




図1 調査地点

## 3 調査項目及び分析方法

表1 調査項目

|        | 項目  | 分析方法                      |
|--------|---|---------------------------|
| 質量     | 質量濃度  | 重量法                       |
| イオン成分  | Na <sup>+</sup> 、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 、K <sup>+</sup> 、Mg <sup>2+</sup> 、Ca <sup>2+</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | 水抽出-イオンクロマトグラフ法           |
| 炭素成分   | 有機炭素 (OC1、OC2、OC3、OC4)<br>元素状炭素 (EC1、EC2、EC3)<br>炭素補正值 (OCpyro)   | サーマルオプティカル・リフレクタンス法       |
| 無機元素成分 | Na、Al、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Mo、Sb、Cs、Ba、La、Ce、Sm、Hf、W、Ta、Th、Pb   | 無機元素の多元素同時測定法(酸分解/ICP-MS) |

#### 4 採取

##### (1) 採取方法

「大気中微小粒子状物質 (PM2.5) 成分測定マニュアル」(以下「成分測定マニュアル」という。)の捕集法に準ずる。

##### (2) 頻度

年4回(春季、夏季、秋季、冬季)

各調査時期に連続14日間の採取を実施。

#### 5 調査結果

##### (1) 調査期間の気象

表2(1) 調査期間中の気象データ

| 季節 | サンプリング実施時期 |      |   |    |    |   |   |    |      |   |    |     |         |        | 気象条件  |        |         |                         |        |      |  |
|----|------------|------|---|----|----|---|---|----|------|---|----|-----|---------|--------|-------|--------|---------|-------------------------|--------|------|--|
|    | 年          | 月    | 日 | 時  | 分  | ～ | 年 | 月  | 日    | 時 | 分  | 主風向 | 風速(m/s) | 気温(°C) | 湿度(%) | 雨量(mm) | 気圧(hPa) | 日射量(MJ/m <sup>2</sup> ) |        |      |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 9  | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 10 | 9   | 0       | N      | 2.1   | 15.5   | 54      | --                      | 1019.2 | 23.9 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 10 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 11 | 9   | 0       | S      | 1.6   | 19.2   | 53      | --                      | 1021.3 | 23.2 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 11 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 12 | 9   | 0       | S      | 1.7   | 22.2   | 62      | 5                       | 1016.9 | 17.8 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 12 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 13 | 9   | 0       | E      | 1.9   | 19.3   | 84      | 260                     | 1009.6 | 4    |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 13 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 14 | 9   | 0       | NNW    | 1.3   | 15.7   | 61      | --                      | 1014.7 | 15.8 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 14 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 15 | 9   | 0       | N      | 1.6   | 19     | 52      | --                      | 1016.2 | 22.5 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 15 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 16 | 9   | 0       | E      | 2.5   | 20.5   | 64      | --                      | 1008.5 | 16.4 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 16 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 17 | 9   | 0       | SW     | 4     | 17.8   | 53      | --                      | 1011.6 | 17.9 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 17 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 18 | 9   | 0       | N      | 2.1   | 20.4   | 54      | --                      | 1017.9 | 22.6 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 18 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 19 | 9   | 0       | S      | 1.4   | 22.9   | 43      | --                      | 1017.7 | 17.8 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 19 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 20 | 9   | 0       | E      | 2.4   | 17.6   | 77      | 5                       | 1015.7 | 7.8  |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 20 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 21 | 9   | 0       | C      | 1.4   | 21.5   | 65      | --                      | 1015.5 | 18.6 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 21 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 22 | 9   | 0       | E      | 2.2   | 22     | 61      | --                      | 1017.9 | 21.2 |  |
| 春  | 西暦         | 2024 | 5 | 22 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 5 | 23 | 9   | 0       | E      | 1.5   | 21.7   | 65      | --                      | 1015.4 | 14.3 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 18 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 19 | 9   | 0       | S      | 1.4   | 30.3   | 70      | --                      | 1009.6 | 15.9 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 19 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 20 | 9   | 0       | SW     | 2.4   | 31.8   | 64      | --                      | 1009.7 | 19.9 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 20 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 21 | 9   | 0       | WSW    | 1.7   | 30.9   | 68      | --                      | 1011.5 | 15.6 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 21 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 22 | 9   | 0       | SW     | 2.7   | 32.2   | 64      | --                      | 1010.9 | 23   |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 22 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 23 | 9   | 0       | SW     | 2     | 31.8   | 60      | --                      | 1009.5 | 22.7 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 23 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 24 | 9   | 0       | SSW    | 1.8   | 31.5   | 64      | 20                      | 1007.9 | 20.7 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 24 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 25 | 9   | 0       | W      | 1.5   | 30.2   | 73      | --                      | 1008.1 | 12.7 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 25 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 26 | 9   | 0       | E      | 1.6   | 31     | 72      | --                      | 1011.2 | 15.4 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 26 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 27 | 9   | 0       | S      | 1.8   | 32.5   | 64      | --                      | 1017   | 20.7 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 27 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 28 | 9   | 0       | SSW    | 1.9   | 32.8   | 63      | --                      | 1017.7 | 21.3 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 28 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 29 | 9   | 0       | SW     | 2.5   | 32.6   | 62      | --                      | 1012.8 | 21.7 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 29 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 30 | 9   | 0       | WSW    | 4     | 32.1   | 61      | --                      | 1007.4 | 22.6 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 30 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 7 | 31 | 9   | 0       | WNW    | 3.5   | 31.7   | 62      | --                      | 1006   | 20.9 |  |
| 夏  | 西暦         | 2024 | 7 | 31 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 8 | 1  | 9   | 0       | SW     | 2     | 31.9   | 65      | --                      | 1006.5 | 18.8 |  |

表2(2) 調査期間中の気象データ

|   |    |      |    |    |    |   |   |    |      |    |    |   |   |     |     |      |    |     |        |      |
|---|----|------|----|----|----|---|---|----|------|----|----|---|---|-----|-----|------|----|-----|--------|------|
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 17 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 18 | 9 | 0 | E   | 1.4 | 24.8 | 68 | --  | 1020.7 | 11.8 |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 18 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 19 | 9 | 0 | E   | 1.5 | 25.5 | 80 | 15  | 1015.6 | 7.2  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 19 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 20 | 9 | 0 | NNW | 1.9 | 20   | 72 | 195 | 1020   | 2.8  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 20 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 21 | 9 | 0 | E   | 1.9 | 17   | 57 | --  | 1027.7 | 11.1 |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 21 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 22 | 9 | 0 | E   | 2.6 | 22.3 | 62 | --  | 1024.2 | 11   |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 22 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 23 | 9 | 0 | E   | 1.9 | 21.6 | 86 | 115 | 1015   | 3.3  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 23 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 24 | 9 | 0 | N   | 2.3 | 20.8 | 70 | --  | 1015.7 | 9.4  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 24 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 25 | 9 | 0 | NNW | 1.1 | 20.1 | 69 | --  | 1021.1 | 8.6  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 25 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 26 | 9 | 0 | E   | 1.6 | 20.3 | 63 | --  | 1023   | 11.4 |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 26 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 27 | 9 | 0 | E   | 0.9 | 21   | 73 | --  | 1017.7 | 6.6  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 27 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 28 | 9 | 0 | E   | 1.1 | 21.2 | 84 | 180 | 1010.6 | 6.2  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 28 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 29 | 9 | 0 | E   | 1.4 | 19.2 | 71 | --  | 1014.9 | 6.1  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 29 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 30 | 9 | 0 | E   | 1   | 17   | 86 | 145 | 1017.1 | 3.2  |
| 秋 | 西暦 | 2024 | 10 | 30 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2024 | 10 | 31 | 9 | 0 | N   | 1.3 | 17.9 | 65 | --  | 1022.2 | 10.9 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 16 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 17 | 9 | 0 | W   | 2.9 | 6.6  | 50 | --  | 1021.5 | 10.9 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 17 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 18 | 9 | 0 | N   | 1.2 | 4.8  | 64 | --  | 1024.3 | 4.9  |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 18 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 19 | 9 | 0 | N   | 1.2 | 5.3  | 60 | --  | 1022.3 | 11.7 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 19 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 20 | 9 | 0 | NNW | 0.9 | 8    | 68 | --  | 1015.2 | 8    |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 20 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 21 | 9 | 0 | SW  | 1.8 | 8.3  | 65 | --  | 1014.9 | 10.3 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 21 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 22 | 9 | 0 | WSW | 1.3 | 7.5  | 65 | --  | 1020.1 | 9    |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 22 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 23 | 9 | 0 | N   | 1.7 | 7.7  | 69 | --  | 1023   | 9.6  |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 23 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 24 | 9 | 0 | C   | 0.9 | 8.6  | 69 | --  | 1022.1 | 10.1 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 24 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 25 | 9 | 0 | E   | 1.2 | 9.4  | 59 | --  | 1022.7 | 10.4 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 25 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 26 | 9 | 0 | NW  | 1.4 | 6.1  | 57 | --  | 1024   | 11.4 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 26 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 27 | 9 | 0 | E   | 1.2 | 7    | 52 | --  | 1018.5 | 7.8  |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 27 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 28 | 9 | 0 | W   | 2.5 | 7.1  | 62 | --  | 1012.8 | 4.7  |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 28 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 29 | 9 | 0 | W   | 4.7 | 6.5  | 39 | --  | 1014.6 | 10.3 |
| 冬 | 西暦 | 2025 | 1  | 29 | 10 | 0 | ～ | 西暦 | 2025 | 1  | 30 | 9 | 0 | W   | 3.8 | 4.9  | 47 | --  | 1020.5 | 8.6  |

風速、気温及び湿度は、調査期間中の1時間値の平均値を示した。雨量は、調査期間中の合計量を示した。

また、図2に松江局の風配図を示す。




図2(1) 各調査日の風配図(松江局)(風配図には静穏(風速0.5m/s未満)を含む。)




図2(2) 各調査日の風配図(松江局)(風配図には静穏(風速0.5m/s未満)を含む。)

## (2) 質量濃度

質量濃度の測定結果は、図3-1及び図3-2に示すとおりである。




図3-1 質量濃度測定結果




図3-2 季節ごとの質量濃度測定結果

測定日ごとの日平均値は、 $4.5 \sim 47.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ の範囲であり、5月20日、1月22日及び23日に環境基準を超過していた。それ以外の期間については、環境基準値を満足していた。

各季の平均値は、 $7.6 \sim 17.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ の範囲であり、四季を通じてみると、冬季の平均値が最も高かった。なお、年間の平均値は、 $14.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、環境基準値（長期基準： $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）未満であった。

## (3) 質量濃度に対するイオン成分、無機元素成分及び炭素成分の組成割合

質量濃度に対する各成分の濃度及び割合は、図4-1及び図4-2に示すとおりである。なお、無機元素成分のうち、ナトリウム、カリウム及びカルシウムは、イオン成分と重複するため、グラフからは除いている。




図4-1 質量濃度に対する各成分の濃度




図4-2 各成分の割合

質量濃度に対する各成分のうち、冬季にイオン成分の割合が最も高く、春季から秋季にかけて炭素成分の割合が高かった。夏季は塩素イオンやカリウムイオン量が少なかった。これは、成分測定マニュアルに記載されている発生源の指標となる成分の表によると、該当地域での廃棄物の焼却が少なかったことを示唆する結果である。

#### (4) イオン成分

イオン成分濃度の測定結果は、図5-1から図5-4に示すとおりである。なお、図5-1には、質量濃度との変動を比較するために、当該結果を参考として再掲している。




図5-1(1) イオン成分濃度測定結果




図5-1(2) イオン成分濃度測定結果




図5-2 イオン成分濃度測定結果（全体濃度）




図5-3 イオン成分濃度の割合




図5-4 季節ごとのイオン成分濃度測定結果

イオン成分は硫酸イオン、硝酸イオン及びアンモニウムイオンが高い割合を示し、四季を通じて質量濃度の変動と同様に推移した。

季節ごとの変化を見ると、硫酸イオンは、冬季以外の季節では最も割合が高く、全体の20%～70%を占めていた。また、アンモニウムイオンは、四季を通じて割合があまり変わらず、10%～25%で推移していた。硝酸イオンについては、夏季1.6%～冬季52%と大きな差があった。硝酸イオンは自動車排ガス等で排出された窒素酸化物が大気中での光化学反応や降雨への溶解により、硝酸を形成し、大気中のアンモニアと反応することにより、硝酸アンモニウム塩を形成するといわれている。硝酸アンモニウムは微小粒子として長期間滞留するが、夏季等の高温下では生成されにくく、ガス状の硝酸及びアンモニアの存在割合が大きくなり、発生源からあまり輸送されずに沈着する可能性が高いため、夏季に低濃度であったと考えられる。

### (5) 炭素成分

炭素成分の測定結果は、図6-1から図6-4に示すとおりである。なお、図6-1には、質量濃度との変動を比較するために、当該結果を参考として再掲している。



図6-1(1) 炭素成分濃度測定結果






図6-1(2) 炭素成分濃度測定結果




図6-2 炭素成分濃度測定結果 (全体濃度)




図6-3 OCとECの割合





図6-4 季節ごとの炭素成分濃度測定結果及び割合

質量濃度の変動に対して、有機炭素（以下OC）及び元素状炭素（以下EC）どちらもほぼ同じような変動を示した。

OCとECの濃度を比較した結果、全ての測定日でOCの濃度が高かった。

季節ごとの濃度では、OCは秋季に最も高く、夏季と冬季が同程度に低かった。また、ECはOCとは反対の傾向にあった。

OCとECの割合については、夏季がEC35.5%と最も高く、次に冬季EC35.4%、春季30.8%の順であった。ECは、自動車排気や石油燃焼の指標元素とされており、夏季と冬季に最もコンビナートからの影響を受けている可能性が示唆された。

#### (6) 無機元素成分

無機元素成分の測定結果は、図7-1から図7-4に示すとおりである。なお、図7-1には、質量濃度との変動を比較するために、当該結果を参考として再掲している。




図7-1(1) 無機元素成分濃度測定結果




図7-1(2) 無機元素成分濃度測定結果




図7-1(3) 無機元素成分濃度測定結果




図7-1(4) 無機元素成分濃度測定結果




図7-1(5) 無機元素成分濃度測定結果




図7-1(6) 無機元素成分濃度測定結果




図 7-1(7) 無機元素成分濃度測定結果




図 7-2 無機元素成分濃度測定結果 (全体濃度)






図 7-3 季節ごとの無機元素成分濃度測定結果




図7-4 季節ごとの無機元素成分濃度の順位（29成分のうち上位20成分について表示）

全体の濃度でみると、年間の測定日のうち、5月16日が最も高い濃度となり、質量濃度との一致は見られなかった。鉄の割合が最も多いが、カリウム、カルシウム、アルミニウムなども高濃度であった。

季節ごとの濃度では、年間を通じてナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、マンガン、鉄及び亜鉛の各成分は、変動はあるものの無機元素成分の中では多く存在していた。このうち鉄は、全ての季節で最も高い濃度を示したが、特に春季が高濃度であった。

無機元素成分は、成分測定マニュアルによると、発生源の指標となる成分があり、上記の結果と関連付けると次のとおりとなる。

表3 各日で高濃度及び通年で高濃度を示した成分と発生源指標の関係

| 5月16日 | 7月29日 | 10月23日 | 1月28日 | 通年 | 成分名 | 海塩粒子 | 土壌 | 道路粉じん | 自動車排気 | ブレーキ粉じん | タイヤ粉じん | 鉄鋼工業 | 石油燃焼 | 廃棄物焼却 | 野焼き |
|-------|-------|--------|-------|----|-----|------|----|-------|-------|---------|--------|------|------|-------|-----|
| ○     | ○     | ○      | ○     | ○  | Na  | ○    |    |       |       |         |        |      |      | ○     |     |
| ○     |       |        | ○     | ○  | Al  |      | ○  | ○     |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Si  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
| ○     | ○     | ○      | ○     | ○  | K   |      |    |       |       |         |        |      |      | ○     | ○   |
| ○     | ○     | ○      | ○     | ○  | Ca  |      | ○  | ○     |       |         |        | ○    |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Sc  |      | ○  | ○     |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       | ○  | Ti  |      | ○  | ○     |       | ○       |        | ○    |      |       |     |
|       |       |        |       |    | V   |      |    |       |       |         |        |      | ○    |       |     |
|       |       |        |       |    | Cr  |      |    |       |       |         |        | ○    |      | ○     |     |
|       |       |        |       | ○  | Mn  |      |    |       |       |         |        | ○    |      |       |     |
| ○     | ○     | ○      | ○     | ○  | Fe  |      |    | ○     |       | ○       |        | ○    |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Co  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Ni  |      |    |       |       |         |        | ○    | ○    |       |     |
|       |       |        |       | ○  | Cu  |      |    |       |       | ○       |        | ○    |      | ○     |     |
|       | ○     | ○      |       | ○  | Zn  |      |    |       |       |         | ○      | ○    |      | ○     |     |
|       |       |        |       |    | As  |      |    |       |       |         |        |      |      | ○     |     |
|       |       |        |       |    | Se  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Rb  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Mo  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Sb  |      |    |       |       | ○       |        |      |      | ○     |     |
|       |       |        |       |    | Cs  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Ba  |      |    |       |       | ○       |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | La  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Ce  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Sm  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Hf  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | W   |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Ta  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Th  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |
|       |       |        |       |    | Pb  |      |    |       |       |         |        |      |      |       |     |

表3では、各季節で最も無機元素濃度が高かった日で特に高濃度であった成分（測定期間中の上位5番以内に入ったもの）を示す。

無機元素濃度が春季及び年間の測定日で最も高かった5月16日に高濃度であった成分について、海塩粒子、土壌、道路粉じん、ブレーキ粉じん、鉄鋼業及び廃棄物焼却等の発生源指標と共通する成分が多くみられた。

夏季で最も高かった7月29日に高濃度であった成分について、海塩粒子、土壌、道路粉じん、ブレーキ粉じん、タイヤ粉じん、鉄鋼業及び廃棄物焼却等の発生源指標と共通する成分が多くみられた。

秋季で最も高かった10月17日に高濃度であった成分について、海塩粒子、土壌、道路粉じん、ブレーキ粉じん、タイヤ粉じん、鉄鋼業及び廃棄物焼却等の発生源指標と共通する成分が多くみられた。冬季で最も高かった1月28日に高濃度であった成分について、海塩粒子、土壌、道路粉じん、ブレーキ粉じん、タイヤ粉じん、鉄鋼業及び廃棄物焼却等の発生源指標と共通する成分が多くみられた。

年間を通じてみると、成分濃度から、道路粉じん、ブレーキ粉じん、鉄鋼工業及び廃棄物焼却が発生源として多く存在していると考えられる。

鉄鋼工業を示す指標のうち、鉄は年間を通じて濃度が高く、カリウム、ナトリウム及びカルシウムも比較的濃度が高かった。廃棄物焼却を示す指標では、カリウム、ナトリウムともに秋季に高い傾向を示した。

## 6 質量濃度の高濃度時の要因解析

今回の調査では、1月23日の質量濃度の日平均値が $47.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ と最も高くなり、環境基準（短期基準： $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）を超過した。この日は、イオン成分が最も高く、炭素成分は2番目に濃度が高かった。無機成分については、目立って濃度が高いということはない。

高濃度時の気象状況を調べるため、空気塊の由来と移流経路を求める解析手法として用いられている、後方流跡線解析を行った。結果は図8に示すとおりである。

また、環境基準値を超過した5月20日、1月22日についても後方流跡線解析を行った。その結果は図8に示すとおりである。

なお、夏季と秋季については、最も高濃度となった日でも環境基準値の6割以下の値であり、特に高濃度とは言えないためここでは省略する。

1月23日6時起点（遡及時間：72時間）

NOAA HYSPLIT MODEL  
Backward trajectory ending at 0600 UTC 23 Jan 25  
GDAS Meteorological Data





図8(1) 後方流跡線解析図（観測地点高度：3m NOAA HYSPLIT MODEL）  
（掲載元：ARL、HYSPLIT Trajectory Model Results）

1月23日の要因解析について、松江局到達3日前までにおいて大陸からの移流が見られる。同日は、質量濃度中のイオン成分の絶対量が大きく、中でも硝酸、硫酸、アンモニウムイオンの検出が多かった。この3成分だけでイオン成分の96%を占めていた。このことから硝酸アンモニウム及び硫酸アンモニウムが多く持ち込まれたことが高濃度の一因であると推測される。硝酸アンモニウム粒子は、自動車や固定発生源から排出された窒素酸化物が酸化され、アンモニアガスと反応することにより二次生成すると言われている。風配図（図2）から、当日は主に南西方向から比較的強い風が吹いていることが分かり、大陸からの移流ではなく、移動発生源からの寄与が、質量濃度を押し上げる一因であったと推測される。また、硫酸アンモニウム粒子は、工場や発電所等の人為発生源などから排出された二酸化硫黄が大気中で酸化され、空気中のアンモニアガスと反応することによって二次生成すると言われている。当日は、市内の二酸化硫黄濃度の高い測定局は確認されておらず、周辺コンビナートで発生した硫酸アンモニウムが多く捕集されたものと推察する。こちらも風配図から、大陸からの移流ではなく、コンビナート由来であることが推測される。

5月20日6時起点 (遡及時間: 72時間)

NOAA HYSPLIT MODEL  
Backward trajectory ending at 0600 UTC 20 May 24  
GDAS Meteorological Data



1月22日6時起点 (遡及時間: 72時間)

NOAA HYSPLIT MODEL  
Backward trajectory ending at 0600 UTC 22 Jan 25  
GDAS Meteorological Data




図8(2) 後方流跡線解析図(観測地点高度: 3m NOAA HYSPLIT MODEL)  
(掲載元: ARL, HYSPLIT Trajectory Model Results)

5月20日については、太平洋に空気塊が滞留しており、大陸からの移流はなかった。同日は、質量濃度中のイオン成分と炭素成分からの持ち込みが多かった。イオン成分については、1月23日同様、硫酸、硝酸、アンモニウムイオンが多く検出されている。風配図からも同様に、当日は主に南西方向から比較的強い風が吹いていることが分かり、大陸からの移流ではなく、移動発生源からの寄与が、質量濃度を押し上げる一因であったと推測される。

1月22日については、大陸からの移流が見られた。1月23日同様、同日は、質量濃度中のイオン成分の絶対量が大きく、中でも硝酸、硫酸、アンモニウムイオンの検出が多かった。風配図(図2)からも同様に、当日は主に北東方向から比較的強い風が吹いていることが分かり、このことから、移動発生源及び周辺コンビナートからの寄与が、質量濃度を押し上げる一因であったと推測される。

## 7 まとめ

質量濃度について、四季の中で冬季に最も高い濃度を記録し、調査期間中は5月20日、1月22日及び23日に環境基準を超過していた。それ以外の期間については、環境基準値を満足していた。質量濃度に対する各成分の割合は、秋季は炭素成分がイオン成分よりも多かったものの、それ以外の季節では、イオン成分、炭素成分、無機元素成分の順であった。

イオン成分について、硫酸イオンが春季、夏季、秋季において最も高く、冬季では硝酸イオンが最も高かった。次にアンモニウムイオンが春季から秋季にかけて高かったが、冬季は、硝酸イオンがアンモニウムイオンを上回った。

炭素成分について、OCとECの濃度を比較した結果、全ての測定日でOCの濃度が高くな

った。季節ごとの濃度では、OCは秋季に最も高く、夏季と冬季が同程度に低かった。OCとECの割合については、夏季と秋季が最も高くなり、コンビナートの強い影響が示唆された。

無機元素成分について、年間を通じてナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、マンガン、鉄及び亜鉛の各成分は、季節で変動はあるものの成分の中では多く存在していた。このうち鉄は、秋季以外の全ての季節で最も高い濃度を示したが、特に春季、夏季に高濃度であった。

発生源指標と成分濃度の関係から、年間を通じてみると、道路粉じん、ブレーキ粉じん、鉄鋼工業及び廃棄物焼却が発生源として多く存在していると考えられる。

後方流跡線解析により、今年度の高濃度の要因は同一のものと推測することができた。